ORIGINE

Streptocoque ß-hémolytique du groupe A

ÉVOLUTION







Guérison rapide sous antibiotiques



Surtout en hiver

COMPLICATIONS

Abcès péri-amygdalien, rhumatisme articulaire aigu, glomérulonéphrite aiguē.

PRÉVENTION



Hygiène habituelle



Aération du logement



Température entre 18 et 20°C



Exposition au tabac



Partage objets et linge



Contacts étroits

FACTEURS DE RISOUES



Rhumatisme articulaire aigu



TRAITEMENT 4

ou semaines sans

traitement.



Antibiothérapie orale pendant environ 6 jours.

CONTAGIOSITÉ (5)

Maximale au stade aïgu.

L'enfant sera contagieux

pendant plusieurs jours

LA SCARLATINE

TOUCHE SURTOUT LES ENFANTS ENTRE 5 ET 10 ANS



Ne pas confondre avec une dermite de contact, la maladie de Kawasaki, une allergie ou la rougeole

- OUELS SONT LES SYMPTÔMES ? -

État général plus ou moins bon



Fièvre



Mal de gorge, dysphalgie



Douleurs abdominales



Nausées, vomissements



Zones de plis particulièrement atteintes



Gonflements des ganglions lymphatiques

Pâleur du pourtour de la bouche et du nez



Pétéchies

Amygdales rouges et tuméfiées Langue suburrale

Langue suburrale puis rouge framboise



ÉVICTION SCOLAIRE

Du diagnostic jusqu'à 48h après le début des antibiotiques.



RISOUE EMBRYO-FŒTAL

Aucun effet négatif connu sur le fœtus.

© Cherry for Life Science